



GET THE FACTS AND STAY INFORMED ABOUT CERVICAL CANCER!



Cervical cancer is the **fourth most common cancer** in people with a cervix globally, with an estimated **660,000** new cases and **350,000** deaths in 2022. (World Health Organization)

In 2024, an estimated



of invasive cervical cancer will be diagnosed in the U.S. and about **4,360** will die from the disease. (American Cancer Society Facts & Figures)



All people with a cervix should begin cervical cancer screening starting at age 21.



Anyone with a cervix is at risk for cervical cancer.

More than 75%

of U.S. parents have chosen to protect their children from HPV cancer with the HPV vaccine.

Almost all cervical cancers are caused by persistent infection with certain types of



Human Papilloma Virus (HPV)

HPV infections are common in healthy people and usually resolve before becoming chronic, only rarely causing cancer. (American Cancer Society)

It is recommended that healthcare providers routinely offer the HPV vaccine series to **youth between**

ages 9-12



Special emphasis has been given to starting at age 9 to increase the success of completing the series by age 13. (National HPV Vaccination Roundtable)

The HPV vaccine can prevent

more than 90% of **6 HPV cancers**

when given at the recommended ages.

There are two types of cervical cancer screenings available:

The Pap Test and the HPV Test



Currently, there is new technology being developed for **Self-Sampling HPV tests**.

It's important for you to have the resources to participate in important shared decision-making conversations with your physician. Together you will review your history, current recommended screening guidelines, and make the best decisions for your care.



KNOWLEDGE IS POWER!

For more information to learn more about cervical cancer, visit www.cervivor.org

**#Cervivor #CervicalCancer
#WeAreCervivor**



OBTÉN INFORMACIÓN VITAL SOBRE EL CÁNCER DE CÉRVIX



El cáncer de cérvix es el **4º cáncer más común** en personas con cérvix en el mundo, con un estimado de **660,000** casos nuevos y **350,000** muertes en 2022. (World Health Organization)

Se estima que en 2024 se diagnosticarán



de cáncer de cérvix invasivo en EE.UU. y unas **4,360 personas morirán.** (American Cancer Society Facts & Figures)



Todas las personas con cérvix deben comenzar a hacerse pruebas de detección a los 21 años.



Cualquier persona con cérvix está en riesgo de contraer cáncer de cérvix.

Más del **75%**

de los padres en EE. UU. han elegido proteger a sus hijos del cáncer con la vacuna contra el VPH.

Casi todos los cánceres de cérvix son causados por una infección persistente con ciertos tipos del



Virus del Papiloma Humano (VPH)

Estas son comunes en personas sanas. Usualmente se resuelven y raramente se convierten en cáncer. (American Cancer Society)

Se recomienda que los profesionales de sanidad ofrezcan la serie de vacunas contra el VPH a **menores de**

9 a 12 años



Se le da un énfasis especial a comenzar a los 9 años para poder completar la serie con éxito a los 13 años. (National HPV Vaccination Roundtable)

La vacuna del VPH puede prevenir más del **90%** de **6 tipos de cáncer VPH** cuando se administra en las edades recomendadas.

Hay dos tipos de pruebas de detección disponibles: el **Papanicolaou** y el **examen de VPH**



Actualmente se está desarrollando nueva tecnología para **pruebas de VPH por automuestreo.**

Es importante que tengas los recursos para participar en conversaciones importantes con tu médico sobre la toma de decisiones compartidas. Juntos revisarán tu historial, las pautas de detección recomendadas actualmente, y tomarán las mejores decisiones para tu cuidado.



¡EL CONOCIMIENTO ES PODER!

Para obtener más información sobre el cáncer de cérvix, visita www.cervivor.org

**#Cervivor #CancerCervical
#SomosCervivor**